



寝る前に点眼する場合

- このお薬を点眼した直後に就寝すると起床時にまぶたが開きづらくなる恐れがあるため寝る前の少なくとも**30分以上前**に点眼してください。
- もしまぶたが開きづらくなった場合は、水道水等のきれいな水で洗い流してください。



点眼後に何か異常を感じたときは、
すぐに医師または薬剤師にご相談
ください。




シスタドロップスをお使いの患者さんとご家族の方へ

このパンフレットは、患者さんにご家族の方にシスタドロップスの正しい使い方を理解していただくことを目的に作成しました。



シスタドロップスの 形体と使い方




使い方

1回1滴、1日4回点眼してください。なお、症状により適宜回数を減らすことがありますので、患者さん、あるいは、保護者の判断で変更せず、医師の指示に従ってください。

点眼の間隔は、生活リズムにあわせて担当医師の指示通りの方法で行ってください。

使用期限

- バイアル開封後の使用期限は、**7日間**です。忘れないように冷蔵庫から取り出した日とそこから7日後の日付を箱に記載してください。
- 開封後7日間を過ぎた点眼液は使用しないでください。



例

月	火	水	木	金	土	日
1日目 (開封日)	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目 (使用期限)
1日目 (新しいお薬の開封日)	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目 (新しいお薬の使用期限)

保管方法

開封前

- 箱のまま冷蔵庫で保管してください。




開封後

- 点眼液のキャップをよく締めてから箱に入れて、直射日光を避け、小さい子供の手の届かないところに保管してください。
- 冷所（1～15℃）を避けて常温（15～25℃）で保管してください。また、冷蔵（2～8℃）で保存した点眼液は粘性が高く点眼しにくいいため、一度開封した点眼液は、冷蔵庫には戻さないでください。



点眼前の準備

- 冷蔵庫から取り出した直後の点眼液は高い粘性があります。最初に使うときは常温（15～25℃）で1時間以上置いて、液がなめらかになったことを確認してから点眼してください。



点眼用ノズルの装着方法

① 緑色の保護キャップを取りはずします(下図①)。

② 金属のシールを取りはずします(下図②)。


注：金属のシールで指等を切らないよう注意してください。

③ 灰色の栓をバイアルから取りはずします(下図③)。

注：灰色の栓をはずした後、バイアルの口に手が触れないよう注意してください。

④ 点眼用ノズルを袋から取り出し、ノズルの装着部分に手が触れないように注意しながらバイアルに装着します(下図④)。

⑤ 点眼用ノズルを清潔に保つため、先端の白色の小さいキャップを失くさないように注意してください(下図⑤)。




点眼方法


！ 点眼前の注意

- 点眼前に手をよく洗ってください。
- コンタクトレンズは点眼前にはずしてください。**点眼後15分以上経過**してからコンタクトレンズを装着してください。

- ① 白色の小さいキャップをはずし、点眼用ノズルの真ん中あたりを軽く持ちます。



- ② さかさまにして、液が点眼用ノズルの中に流れ出てくることを確認してください。



- ③ 頭を後方に傾け、反対側の手で下まぶたを引いて、下まぶたと眼の間の赤い部分に1滴点眼します。
点眼するときは、点眼ノズルに少しずつ力を加えて1滴点眼してください。



- ④ 点眼後、眼を閉じ、目頭を**1分間**軽くおさえてください。

- ⑤ 眼からあふれた液は、ガーゼ等ですぐに拭いてください。

- ⑥ 反対側の眼も同様に点眼してください。

- ⑦ 点眼後は、すぐに白色の小さいキャップを閉めてください。

点眼における注意

基本事項

- 本剤は澄明で粘稠性のある液ですが、微量の繊維状物質を含むことがあります。もし、ご不安がある場合は、使用する前に医師又は薬剤師に相談してください。
- できる限り決められた時刻に点眼してください。
- 投与回数は1日4回を超えないようにしてください。
- 1滴すべてが眼に入らなかった場合でも、やり直しの点眼はしないでください。ただし、眼に入らず完全に頬等にはずれた場合は、追加で点眼してください。
- 眼の周りにあふれた液は、直ちにガーゼ等で拭き取ってください。
- 点眼ノズルの先端部分および点眼液の汚染防止のため、投与時にノズルの先端がまぶたやその周辺およびその他の表面に接触しないように注意してください。



ほかの薬との併用

- このお薬以外の点眼液を使用する場合は、**このお薬を点眼後10分以上間隔をあけてください。**
- 眼軟膏を使用する場合は、このお薬の点眼後10分以上間隔をあけ、最後に使用してください。

点眼を忘れた場合

- 投与予定時刻より**1時間を過ぎた場合は次の回に点眼してください。**