

フルタミド錠125mg「VTRS」を 服用される患者さんご家族の方へ

このお薬は、男性ホルモンの働きを抑える効果を持ち、前立腺がん細胞の増殖を抑えます。

お薬を服用し始める前に

- このお薬の服用中に**肝臓の働きが低下**することがあります。この肝臓に対する副作用について十分に説明を受け、このお薬を服用し始めるようにしてください。
- 肝臓の働きをチェックするため定期的(少なくとも1ヵ月に1回)に肝機能検査を受ける必要があります。
- 以下にあてはまる方は、**必ず医師または薬剤師にお伝えください**。
 - ・ 肝臓の働きが低下している方
 - ・ お薬に対して過敏な反応を経験したことがある方
 - ・ 他のお薬を使用している方

肝臓の働きが低下したときの症状

肝臓の働きが低下したときには以下のような症状が初めにあらわれます。早めに対処すれば回復も早いので、ご自身でもチェックを行ってください。特にお薬の服用し始めの数ヶ月は気をつけてください。

- ・ 食欲がなくなった、からだがかゆい、吐き気がある、吐いてしまった。
- ・ からだがかゆくなった、発疹がでてきた。
- ・ 皮膚や白目が黄色くなった。
- ・ 尿の色が濃くなった。

以上の症状がみられたときは、
お薬の服用を中止し、直ちに受診してください

お薬の服用方法

- 1日3回、毎食後に1錠をコップ1杯程度の水またはぬるま湯で服用してください。
- 服用量は症状に合わせて医師が変更します。
- 服用し忘れた場合、**決して2回分を一度に服用しないでください。**気がついたときに1回分を服用してください。ただし、次の服用時間が近い場合は1回とばしてください。
- 多く服用してしまった場合、異常を感じたら医師または薬剤師にご相談ください。
- 自己判断で服用をやめたり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。**必ず医師の指示どおりに服用してください。**

服用し始めてからの注意

- 他のお薬を新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師にこのお薬を服用していることをお伝えください。
- 気になる症状があらわれた場合には、医師または薬剤師にご相談ください。



VIATRIS

ヴィアトリス製薬株式会社



読みやすさを追求した書体

2022年4月作成 NBZ57M002A