

シンバスタチン錠

5mg・10mg・20mg「VTRS」を 服用される患者さんにご家族の方へ

このお薬は肝臓のコレステロール合成を阻害することにより、血液中のコレステロールを低下させます。

横紋筋融解症を起こすことがあります

次のような症状があらわれた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。

服用量が増えた方は特にご注意ください。



▶ 筋肉が痛い



▶ 手足の力が入らない



▶ 尿の色が濃い
(赤褐色になる)

横紋筋融解症とは

筋肉が障害され、筋肉痛や脱力などの症状があらわれ、筋肉の成分（ミオグロビン）が血液中に流れ出る病気です。赤褐色の尿がみられることがあり、放っておくと腎障害（腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる）になることもあります。

服用にあたっての注意事項

- このお薬を服用している間は、血液中の脂質値を定期的に検査する必要がありますので、医師が指示した受診日を守ってください。
- このお薬を服用している間は、定期的に肝臓の検査が行われます。
- 他のお薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師にご相談ください。

次のような症状があらわれた場合には、 医師または薬剤師にご相談ください

- 筋肉痛、脱力感、赤褐色の尿
- 全身けん怠感、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる
- 四肢の感覚鈍麻、しびれ感・冷感、筋力低下
- 鼻血・歯ぐきの出血、あおあざができる
- 寒気・発熱、意識障害、かゆみ・発疹

この他にも気になる症状があらわれた場合には、
医師または薬剤師にご相談ください。



VIATRIS

ヴィアトリス製薬株式会社



読みやすさを追求した書体

2022年4月作成 NBZ57M003A