

グリメピリド錠0.5mg「VTRS」

グリメピリド錠1mg「VTRS」

グリメピリド錠3mg「VTRS」

をお飲みになる患者さんとお家族の方へ

このお薬は、すい臓にはたらきかけてインスリンの分泌を促し、血糖*を下げる糖尿病治療薬です。

低血糖を起こすことがありますので、以下の点にご注意ください。必ずご家族やまわりの方にも、このお薬を飲んでいることを知らせておいてください。

また、保護者の方も、日頃からお子様の様子を観察してください。

*：ヘモグロビンA1c（HbA1c）、食後血糖、空腹時血糖

お薬の飲み方

お薬の量や飲み方は、必ず医師の指示を正しく守ってください。

通常、1日0.5～1mgより開始し、1日1～2回朝または朝夕、食前または食後に飲みます。維持量は通常1日1～4mgで、必要に応じて適宜増減されますが、1日最高服用量は6mgまでです。

- コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師にご相談ください。
- 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのをやめないでください。
- 発熱、下痢、嘔吐があり、または食欲がないため食事ができないときは、医師に連絡して指示を受けてください。

■お薬を飲み忘れた場合

- **2回分を一度に飲まないでください。（低血糖を起こすことがあります。）**
- 1回とばして、次の通常のお薬を飲む時間に1回分だけ飲んでください。

低血糖について

●低血糖とは

- 血液中の糖分が少なくなりすぎた状態です。
- 低血糖が重度になると、けいれんを起こすことや意識を失うことがあります。

【低血糖の症状】

- | | | | |
|-----------|----------|--------|------|
| ● 力の抜けた感じ | ● 空腹感 | ● 発汗 | ● 動悸 |
| ● 手足のふるえ | ● 頭痛 | ● 不安 | ● 興奮 |
| ● 神経過敏 | ● 集中力の低下 | ● 精神障害 | |

●低血糖が起こったら

- ブドウ糖 (5~15g) または砂糖 (10~30g) の入った吸収の良いジュース、キャンディなどをすぐにとってください。ただし、アカルボース、ボグリボースなどの α -グルコシダーゼ阻害剤を併用している場合は、砂糖は不適切です。必ずブドウ糖をとってください。
- 高所作業や自動車の運転などの危険を伴う機械を操作しているときに、低血糖を起こすと事故につながります。特に注意してください。
- 低血糖症状を起こした場合は、必ず早めに医師または薬剤師に報告してください。

■保護者の方へ

小さなお子様の場合には低血糖の症状が分からずに、自分で対処できないことがあるため、「低血糖かな？」と思う症状があらわれたときには砂糖やブドウ糖をとらせ、よくならないときは医師にみてもらうようにしてください。

この他にも気になる症状があらわれた場合には、
医師または薬剤師にご相談ください。



VIATRIS

ヴィアトリス製薬株式会社



2022年6月作成 NBZ57M008A