

フィナステリドによる治療の費用について

フィナステリド錠は健康保険の給付対象ではありません。本剤を用いた男性型脱毛症の医療費全額（薬剤費、診察、調剤、服薬指導などを含む）を患者さんに、ご負担いただくこととなります。

なお、保険給付の対象にならない医療の場合、薬剤費を含む各種費用の料金は医療機関・調剤薬局ごとに設定されます。

医師または薬剤師の連絡先

フィナステリド錠
0.2mg・1mg「VTRS」
を服用される
患者さんにご家族の方へ

監修：杏林大学医学部皮膚科学教室 教授
大山 学 先生

ヴィアトリス製薬株式会社



2022年6月作成 NBZ57M011A



服用にあたって

このお薬は基本的に薄毛の進行を遅らせるものです。外見上の薄毛が明らかによくなる方もいらっしゃいますが、もし外見上変化がなくても抜け毛が減少していれば、お薬が効いている可能性が考えられます。

服用上の注意点

- 1日1回決められた量を服用してください。
 - ご自分の判断で量や回数を変更したり、服用を中止したりしないでください。
 - 服用し忘れた場合は、気がついたときにその日の分を服用してください。決して2回分を一度に服用しないでください。
 - 誤って多く服用した場合は医師または薬剤師にご相談ください。
 - 効果が確認できるまで、通常服用を6ヵ月間続けることが大切です。それでも抜け毛の進行が遅くならない場合は、医師にご相談ください。
- 成人男性の方のみ、このお薬を服用できます。
 - 女性には効果が認められていません。
 - 妊婦・授乳婦の方は絶対に服用しないでください。服用した場合、有効成分が体内に吸収されたりすると、男子胎児の生殖器官等の正常発育に影響を及ぼすおそれがあります。
 - 20歳未満の方に対する効果・安全性は確立していません。
- 錠剤を割って服用しないでください。
 - 妊娠中の婦人が破損した錠剤に触れて、有効成分が体内に吸収されたりすると、男子胎児の生殖器官等の正常発育に影響を及ぼすおそれがあります。
 - 錠剤はコーティングされているため、割れたり砕けたりしない限り、通常の扱いにおいて有効成分に触れることはありません。
 - 錠剤を割って服用した場合の安全性・有効性は保証されていません。

- 以下に該当される方は、服用前に必ず医師または薬剤師にご相談ください。
 - 以前に、他のお薬を服用して発疹などが出たことのある方
 - 肝機能障害のある方
 - 前立腺がん検診（PSA検査）を受ける予定がある方
 - 他の病気でお薬を服用している方、新しく服用し始めようとする方（薬局で購入したお薬も）
 - 男性型脱毛症に対して、市販の育毛ローションなど、他の対処法を行っている方
- 次の症状がみられた場合は、肝機能障害の可能性がありますが、すぐに服用をやめて医師の診察を受けてください。

食欲不振、全身倦怠感、皮膚や粘膜が黄色くなる
- その他、以下のような副作用があらわれる可能性があります。気になる症状があらわれた場合は、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。
 - 性欲減退、勃起機能不全
- このお薬をご家族や他の方にあげないでください。
- 誤飲をしないよう、小児の手の届かないところに保管してください。
- このお薬を服用中、および服用後1ヵ月間は献血をしないようにしてください。

その他、いつもと違う症状、気になる症状があらわれた場合には、医師または薬剤師にご相談ください。