

# プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg・0.5mg「VTRS」を 服用される患者さんにご家族の方へ

このお薬を正しく服用するため、  
飲む前に必ずお読みください。

## ご注意ください

- このお薬を飲むと、眠くなったり、前兆もなく急に眠り込んでしまうこと、まためまいや立ちくらみ、ふらつき、失神が起ることがあります。

車の運転や危険を伴う機械の操作、  
高い場所での作業などは行わないで  
ください。



- ドパミン受容体作動薬を飲むと、社会的に不利な結果を招くにもかかわらず、ギャンブルや過剰で無計画な買い物を持続的に繰り返したり、病的に性欲や食欲が亢進したりする『しょうどうせいぎょしょうがい 衝動制御障害（びょうてき と ばく 病的賭博、きょうはくせい 強迫性 こうばい 購買、びょうてきせいよくこうしん 病的性欲亢進、ぼうしょく 暴食など）』が起ることがあります。



以上のような症状があらわれた場合には  
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

次のような症状があらわれた場合には、すぐに  
医師または薬剤師にご相談ください

- 前兆のない急な眠り込み
- 幻覚、妄想、考えがまとまらない
- 痙攣、意識障害
- 発熱、強い筋肉のこわばり、意識がうすれる
- 脱力感、筋肉痛、赤褐色の尿



## お薬を飲むときに気をつけること

- コップ1杯程度の水またはぬるま湯とっしょに飲んでください。
- このお薬の飲み方は、必ず医師の指示に従うようにし、指示なしに飲む量を変えたり、飲むのをやめたりしないでください。
- 高齢の方は、特に医師の指示を守って飲むようにしてください。
- あやまって多く飲んでしまった場合には、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。

この説明書には特に注意していただきたいことだけが書いてあります。  
この他にも気になる症状があらわれた場合やこのお薬についてわからないことがありましたら、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。



**VIATRIS**

ヴィアトリス製薬株式会社



読みやすさを追求した書体

2022年6月作成 NBZ57M012A