

様

年 月 日 ~ 年 月 日

あなたの服用個数は


タクロリムスカプセル 「VTRS」	朝食後	夕食後
0.5mg 		
1mg 		
5mg 		

医師または薬剤師の連絡先

タクロリムスカプセル
0.5mg・1mg・5mg「VTRS」を服用される

潰瘍性大腸炎患者

のみなさまへ



服用前の注意点

- 以下に該当される方は、必ず医師または薬剤師にご相談ください。
 - ・以前にお薬を服用して発疹などが出たことがある方
 - ・ほかにお薬を服用している場合、または新しく服用し始めようとする場合（薬局などで購入したお薬も）
 - ・妊婦あるいは妊娠の可能性のある方、授乳中の方
 - ・予防接種を受ける予定のある方

服用方法に関する注意点

- 服用する直前に包装から取り出して服用してください。
- 必ず指示に従い、コップ1杯の水またはぬるま湯と一緒に服用してください。
- 1日2回、朝夕の食後に服用してください。
- ご自分の判断で量や回数を変更したり、服用を中止したりしないでください。
- **高齢の方は**特に医師の指示を守って服用してください。
- **服用し忘れた場合の対応**
決して2回分を一度に服用しないでください。
気がついた時できるだけ早く1回分を服用してください。ただし、次に服用する時間は5時間以上間隔をあけてください。
- **誤って多く服用した場合は**、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

飲食物に関する注意点

- **グレープフルーツ（ジュース）**と一緒に服用すると、このお薬の作用が強くなる場合がありますので避けてください。
- **セイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・ワート）を含む健康食品**と一緒に服用すると、このお薬の作用が弱くなる場合がありますので避けてください。

服用中の注意点

- 体の抵抗力が弱まり、かぜなどの感染症にかかりやすくなる場合があります。人混みを避けたり、外出後は手洗いやうがいなどをしたり、感染症にかからないように気をつけてください。
- 次のような症状があらわれた場合には、医師または薬剤師にご相談ください。
 - ・腹痛・下痢・血圧上昇・手足の震え・ほてり・感覚異常・吐き気
- **特に、以下のような症状があらわれた場合には、服用をやめ、すぐに医師の診療を受けてください。**
 - ・尿量が減る、全身のむくみ、のどの渇き
 - ・動悸、全身のむくみ、胸痛
 - ・けいれん、意識障害、言語障害
 - ・出血傾向、疲れやすい、むくみ
 - ・発熱、紅斑、水疱・びらん

その他、いつもと違う症状、気になる症状があらわれた場合には、医師または薬剤師にご相談ください。

製 品 名	タクロリムス カプセル0.5mg 「VTRS」	タクロリムス カプセル1mg 「VTRS」	タクロリムス カプセル5mg 「VTRS」
カプセル本体			
PTPシ ー ト			
			