

様

年 月 日 ~ 年 月 日

あなたの服用個数は

タクロリムスカプセル 「VTRS」	夕食後
0.5mg 	
1mg 	

医師または薬剤師の連絡先

タクロリムスカプセル
0.5mg・1mg「VTRS」を服用される

重症筋無力症患者

のみなさまへ



服用前の注意点

- 以下に該当される方は、必ず医師または薬剤師にご相談ください。
 - ・ 息苦しい・つばが飲み込みにくい・全身の脱力感・発熱がある場合
 - ・ 以前にお薬を服用して発疹などが出たことがある方
 - ・ ほかにお薬を服用している場合、または新しく服用し始めようとする場合（薬局などで購入したお薬も）
 - ・ 妊婦あるいは妊娠の可能性のある方、授乳中の方
 - ・ 予防接種を受ける予定のある方

服用方法に関する注意点

- 服用する直前に包装から取り出して服用してください。
- 必ず指示に従い、コップ1杯の水またはぬるま湯と一緒に服用してください。
- 1日1回、夕食後に服用してください。
- ご自分の判断で量や回数を変更したり、服用を中止したりしないでください。
- **高齢の方は**特に医師の指示を守って服用してください。
- **服用し忘れた場合の対応**
決して2回分を一度に服用しないでください。
- **誤って多く服用した場合は**、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

飲食物に関する注意点

- **グレープフルーツ（ジュース）**と一緒に服用すると、このお薬の作用が強くなる場合がありますので避けてください。
- **セイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・ワート）**を含む**健康食品**と一緒に服用すると、このお薬の作用が弱くなる場合がありますので避けてください。

服用中の注意点

- 体の抵抗力が弱まり、かぜなどの感染症にかかりやすくなる場合があります。人混みを避けたり、外出後は手洗いやうがいなどをしたり、感染症にかからないように気をつけてください。
- 次のような症状があらわれた場合には、医師または薬剤師にご相談ください。
 - ・ 腹痛・下痢・血圧上昇・手足の震え・ほてり・感覚異常・吐き気
- **特に、以下のような症状があらわれた場合には、服用をやめてすぐに医師の診療を受けてください。**
 - ・ 尿量が減る、全身のむくみ、のどの渇き
 - ・ 動悸、全身のむくみ、胸痛
 - ・ けいれん、意識障害、言語障害
 - ・ 出血傾向、疲れやすい、むくみ
 - ・ 発熱、紅斑、水疱・びらん

その他、いつもと違う症状、気になる症状があらわれた場合には、医師または薬剤師にご相談ください。

- 病院で定期的に検査を受けてください。
 - ・ 耐糖能異常（血糖、尿糖など）
 - ・ 白血球異常（リンパ球減少、白血球増多）
 - ・ 腎機能検査値異常（血清クレアチニンなど）

製 品 名	タクロリムスカプセル 0.5mg「VTRS」	タクロリムスカプセル 1mg「VTRS」
カプセル本体		
PTP シート		