


リセドロン酸Na錠17.5mg「VTRS」 をお飲みになる患者さんにご家族の方へ



このお薬は**週1回1錠**飲む
骨粗しょう症のお薬です。
毎日飲むお薬ではありません。

お薬の飲み方

- **週1回**、決められた曜日に飲んでください。
- **朝**起きたとき**(食事前)**に**1錠**を**コップ1杯**(約180mL)の水かぬるま湯で飲んでください。
 - 水以外の飲み物（カルシウムやマグネシウムなどを多く含むミネラルウォーター、コーヒー、ジュースを含む）と一緒に飲まないでください。
 - 食べ物や他のお薬と一緒に飲まないでください。
 - お薬をかんだり、口の中で溶かしたりしないでください。
- 飲んでから少なくとも**30分間は横にならず、水以外を飲食したり、他のお薬を飲んだりしない**でください。



■お薬を飲み忘れた場合

- **同じ日に2錠を飲まないでください。**
- その日は飲まないで翌日の朝に1錠飲んでください。その後はあらかじめ決められた曜日に飲んでください。



お薬を飲むにあたっての注意事項

● 次のような方は、飲む前に必ず医師または薬剤師にご相談ください。

- 以前にこのお薬を飲んで、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある方
- 食道通過障害のある方
- 低カルシウム血症のある方
- このお薬を飲んだときに、30分以上立った状態または座った状態を保てない方
- 腎臓に障害のある方
- 妊婦、妊娠している可能性がある、または授乳中の方
- 他のお薬を飲んでいる場合や、新たに飲む場合は、必ず医師または薬剤師にご相談ください。

次のような症状があらわれた場合には、 医師または薬剤師にご相談ください

● 胃不快感 ● 便秘 ● 上腹部痛 など

特に、以下のような症状があらわれた場合には、飲むのをやめてすぐに医師の診療を受けてください。

- 飲み込みにくい、飲み込むときの痛み、胸の痛み、胸やけ
- 皮膚が黄色くなる、白目が黄色くなる、食欲不振、からだがだるい
- 口の痛み、口のはれ、歯が浮いた感じ、歯のゆるみ、あごのしびれ感
- 外耳炎、耳の痛み、耳だれ
- 太ももや太ももの付け根の痛み、前腕の痛み

■歯医者さんで診察を受ける場合

歯の治療を受ける場合は、このお薬（ビスフォスフォネート系薬剤）を飲んでいることを必ず歯科医師にお伝えください。

この他にも気になる症状があらわれた場合には、
医師または薬剤師にご相談ください。



VIATRIS

ヴィアトリス製薬株式会社



読みやすさを追求した書体

2022年7月作成 NBZ57M033A