

リセドロン酸Na錠17.5mg「VTRS」 をお飲みになる患者さんにご家族の方へ



このお薬は

1日1回1錠、8週間毎日飲む
骨ページェット病のお薬です。

お薬の飲み方

- **朝起きたとき（食事前）に1錠をコップ1杯**（約180mL）の水かぬるま湯で飲んでください。
 - 水以外の飲み物（カルシウムやマグネシウムなどを多く含むミネラルウォーター、コーヒー、ジュースを含む）と一緒に飲まないでください。
 - 食べ物や他のお薬と一緒に飲まないでください。
 - お薬をかんだり、口の中で溶かしたりしないでください。
- 飲んでから少なくとも**30分間は横にならず、水以外を飲食したり、他のお薬を飲んだりしないでください。**



■お薬を飲み忘れた場合

- **2回分を一度に飲まないでください。**
- 気がついたときまでにまだ何も食べたり飲んだりしていない場合は、できるだけ早く1回分を飲んでください。
すでに何かを食べたり飲んだりした場合は、その日は飲まないで翌日の朝に1回分を飲んでください。



お薬を飲むにあたっての注意事項

● 次のような方は、飲む前に必ず医師または薬剤師にご相談ください。

- 以前にこのお薬を飲んで、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある方
- 食道通過障害のある方
- 低カルシウム血症のある方
- このお薬を飲んだときに、30分以上立った状態または座った状態を保てない方
- 腎臓に障害のある方
- 妊婦、妊娠している可能性がある、または授乳中の方
- 他のお薬を飲んでいる場合や、新たに飲む場合は、必ず医師または薬剤師にご相談ください。

次のような症状があらわれた場合には、 医師または薬剤師にご相談ください

- 胃不快感 ● 便秘 ● 上腹部痛 など

特に、以下のような症状があらわれた場合には、飲むのをやめてすぐに医師の診療を受けてください。

- 飲み込みにくい、飲み込むときの痛み、胸の痛み、胸やけ
- 皮膚が黄色くなる、白目が黄色くなる、食欲不振、からだがだるい
- 口の痛み、口のはれ、歯が浮いた感じ、歯のゆるみ、あごのしびれ感
- 外耳炎、耳の痛み、耳だれ
- 太ももや太ももの付け根の痛み、前腕の痛み

■ 歯医者さんで診察を受ける場合

歯の治療を受ける場合は、このお薬（ビスフォスフォネート系薬剤）を飲んでいることを必ず歯科医師にお伝えください。

この他にも気になる症状があらわれた場合には、
医師または薬剤師にご相談ください。



VIATRIS

ヴィアトリス製薬株式会社



2022年7月作成 NBZ57M034A