

クロピドグレル錠25mg「VTRS」 クロピドグレル錠75mg「VTRS」 を服用される患者さんにご家族の方へ

このお薬は血のかたまり(血栓)により血管が
つまるのを防ぐお薬です。

25mg



75mg



このお薬を飲むときに気をつけること

- 1日1回、空腹時をさけて飲んでください。(飲み忘れても、2回分を一度に飲んではいけません。)
- 誤って他の人が飲んでしまわないよう、厳重に保管してください。
- 飲み残したお薬については、薬局や医療機関にご相談ください。

- 次のような場合には、クロピドグレル錠「VTRS」を服用していることを医師または薬剤師に必ず伝えてください。

他の医療機関や歯科などで別のお薬の処方を受ける場合

抜歯などの外科的処置や内視鏡検査を受ける場合など

- 特にステント留置後の2ヵ月間は、まれに肝障害や血液障害などの副作用が起きることがあります。定期的に医師の診察を受け、血液検査など、医師の指示に従ってください。
- このお薬を飲んで、以下のような症状に気がついた場合は、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

- 皮膚や白目が黄色くなる
- 皮膚にあおあざができる、ぶつぶつができる
- 気分が悪い ● 倦怠感、脱力感、食欲不振
- うとうとする、意識が低下する
- 鼻や歯ぐきからの出血 ● 尿が褐色になる
- かぜのような症状(熱がでる、さむけ、のどの痛み)

この他にも気になる症状があらわれた場合には、
医師または薬剤師にご相談ください。



VIATRIS

ヴィアトリス製薬株式会社



読みやすさを追求した書体

2022年9月作成 NBZ57M067A