

タダラフィル錠  
CI「VTRS」  
を服用される方へ

連絡先(病院、薬局名)

## タダラフィル錠CI「VTRS」の正しい使い方について。

この冊子にはタダラフィル錠CI「VTRS」に関する大切な情報が記載されています。

タダラフィル錠CI「VTRS」を正しく安全に使用していただくために、服用前に必ず最後までよくお読みください。

また、いつでもご覧いただけるよう、大切に保管してください。



## タダラフィル錠CI「VTRS」を安全に使用していただくために。

以下の点について、医師に十分話されましたか？

- あなたの症状
- 過去及び現在の他の病気
- 服用中の薬

タダラフィル錠CI「VTRS」は性的刺激があった時、自然な勃起を助ける薬です。

この冊子に記載された注意事項を十分ご理解の上、正しく使用してください。

質問や、わからないことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

心臓の病気で、硝酸薬の治療を受けている方は服用しないでください。

狭心症などの心臓病によく用いられるニトログリセリンなどの硝酸薬<sup>注1)</sup>を使用している方は、タダラフィル錠CI「VTRS」を絶対に服用しないでください。

急激に血圧が下降し、重い副作用を起こすことがあります。

- 硝酸薬には飲み薬だけでなく、舌下錠、貼り薬、吸入薬、注射、塗り薬、スプレーなどもあります。
- あなたがお使いの薬に硝酸薬が含まれていないかどうか医師または薬剤師に相談してください。

もし、タダラフィル錠CI「VTRS」服用後に狭心症の発作が起きたら。

発作の治療を受ける際には、必ずタダラフィル錠CI「VTRS」を『服用していること』『服用した時間』を医師にお伝えください。

- 一般に性行為は心臓に負担をかけますので、今まで狭心症と診断されたことがない方でも、性交中に狭心症の発作を起こす場合があります。
- 一般に狭心症の発作の治療には硝酸薬がよく使われますが、タダラフィル錠CI「VTRS」を服用している場合は、急激に血圧が下降するおそれのあることから、硝酸薬が使用できず、他の薬を使用する場合があります。
- 発作時にご本人が医師に伝えられない場合もありますので、パートナー、ご家族にもあらかじめタダラフィル錠CI「VTRS」を服用していることを伝え、救急医療機関を受診する際には、医師などに『タダラフィル錠CI「VTRS」を服用している』ことが必ず伝わるようにしてください。

注1) 詳しい商品名は13-14ページをご覧ください。

**次にあてはまる方はタダラフィル錠  
CI「VTRS」を服用しないでください。**

- 硝酸薬<sup>注1)</sup>を使用中的の方
- 今までにタダラフィル錠 CI「VTRS」を服用して過敏症（アレルギー）を起こしたことがある方
- 肺高血圧症の治療に用いられる sGC 刺激薬（リオシグアト）<sup>注1)</sup>を使用中的の方
- 心血管系障害などにより医師から性行為を控えるように言われた方
- 不安定狭心症のある方、または性交中に狭心症を起こしたことがある方
- コントロール不良の不整脈のある方
- 低血圧の方（最大血圧が90mmHg未満または最小血圧が50mmHg未満の方）
- コントロール不良の高血圧の方（最大血圧が170mmHg以上または最小血圧が100mmHg以上の方）
- 最近3ヵ月以内に心筋梗塞を起こしたことがある方
- 最近6ヵ月以内に脳梗塞・脳出血を起こしたことがある方
- 重い肝障害のある方
- 網膜色素変性症（進行性の夜盲、視野狭窄）の方

注1) 詳しい商品名は13-14ページをご覧ください。

**次にあてはまる方はタダラフィル錠  
CI「VTRS」の服用に際して注意が必要です。  
必ず医師に相談してください。**

- 肝臓の悪い方
- 腎臓の悪い方
- 陰茎の病気（屈曲、しこりなど）のある方
- 血液の病気（鎌状赤血球性貧血、多発性骨髄腫、白血病）のある方
- 血が止まりにくいなど出血性の病気のある方、または消化性潰瘍のある方
- 他の勃起不全治療薬、勃起補助器具を使用している方、手術を受けたことがある方
- 高齢の方（65歳以上）
- 心臓病、高血圧症、排尿障害などの治療薬を服用中の方<sup>注2)</sup>
- 過去に視力喪失の経験のある方

注2) タダラフィル錠 CI「VTRS」には併用してはいけない薬や併用に注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

**必ず医師の指示を守って服用してください。**

タダラフィル錠CI「VTRS」の服用は1日1回とし、次の服用は必ず24時間以上<sup>注3)</sup>あけてください。

注3) 腎障害のある方は、次の服用を48時間以上あけるなどの注意が必要です。必ず医師の指示を守って服用してください。

医師の指示なしに、自分の判断で量を増やさないでください。

- 特に肝臓の悪い方や腎臓の悪い方は、医師の指示を守って服用してください。
- 医師の指示により5mgを服用する場合は、タダラフィル錠10mgCI「VTRS」を半分に割り、1/2錠を服用してください。
- 薬の効果には個人差があります。もし、指示された量で効果が得られない場合には、医師または薬剤師に相談してください。

**タダラフィル錠CI「VTRS」は催淫剤や性欲増進剤ではありません。**

タダラフィル錠CI「VTRS」服用後も、性的刺激のない状態では勃起しません。性的刺激を受けて初めて勃起し、性的刺激が中止されれば(性行為が終了すれば)勃起はおさまります。

なお、勃起が4時間以上続いている場合には、直ちに医師の診察を受けてください。



**タダラフィル錠CI「VTRS」を服用した後に  
気を付けていただきたいこと。**

一般的に薬を服用すると、時に副作用が出る場合があります。タダラフィル錠CI「VTRS」を服用して次のことに気が付いたら、すぐに専門の医師の診察を受けてください。

- 4時間以上勃起が続く。(早急に治療しないとペニス  
が損傷し、勃起機能を失うことがあります。)
- 薬の服用後、急激に目が見えづらくなった。

また、タダラフィル製剤によって、以下の副作用の報告があります。その多くは軽度で一過性ですが、こうした症状の他にも気になる症状がある場合には服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。

- 頭痛
- 顔が赤くなる (ほてり)
- 消化不良

**他の診療科、医療機関を受診される時は、  
タダラフィル錠CI「VTRS」を服用して  
いることを申し出てください。**

他の病気や他の薬に悪い影響を及ぼす場合があります。



**タダラフィル錠CI「VTRS」には  
性行為感染症を防ぐ効果はありません。**

**タダラフィル錠CI「VTRS」を他の人に譲らないでください。**

タダラフィル錠CI「VTRS」の服用は、必ず医師の診断のもとに処方を受ける必要があります。

あなたに処方されたタダラフィル錠CI「VTRS」を、絶対に他の人に渡してはいけません。その人が性行為を行うことが好ましくない心臓の病気にかかっていたり、タダラフィル錠CI「VTRS」と一緒に飲むと影響のある薬を使用されている場合もあり、大変危険です。



**性行為は心臓に負担をかけます。  
無理をしないようにしましょう。**

**視覚・聴覚に異常を感じた場合は、  
服用を中止し、医師に相談してください。**

タダラフィル製剤の服用後、めまいや視覚障害(色が変わって見えるなど)があらわれることがありますので、自動車の運転や危険を伴う機械の操作をする場合にはご注意ください。



次の薬を服用されている方はタダラフィル錠  
CI「VTRS」を服用しないでください。

主なニトログリセリンなどの硝酸薬（飲み薬、舌下錠、  
貼り薬、吸入薬、スプレー）の商品名

成分名	商品名
亜硝酸アミル	亜硝酸アミル「AFP」
一硝酸イソソルビド	アイトロール錠10mg/20mg 一硝酸イソソルビド錠10mg/20mg「サワイ」 一硝酸イソソルビド錠10mg/20mg「タイヨー」 一硝酸イソソルビド錠10mg/20mg「トーワ」 一硝酸イソソルビド錠10mg/20mg「日新」
硝酸イソソルビド	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「ツルハラ」 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「トーワ」 ニトロール錠5mg フランドル錠20mg
	硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「ZE」 ニトロールRカプセル20mg

(右ページにつづく)

成分名	商品名
硝酸イソソルビド	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」 硝酸イソソルビドテープ40mg「テイコク」 硝酸イソソルビドテープ40mg「東光」 ニトロールスプレー1.25mg フランドルテープ40mg
ニコランジル	シグマート錠2.5mg/5mg ニコランジル錠2.5mg/5mg「サワイ」 ニコランジル錠2.5mg/5mg「トーワ」 ニコランジル錠2.5mg/5mg「日医工」
ニトログリセリン	ニトロペン舌下錠0.3mg
	ニトログリセリンテープ27mg「トーワ」 ニトロダームTTS25mg バソレーターテープ27mg ミニトロテープ27mg ミリステープ5mg メディトランステープ27mg
	ミオコールスプレー0.3mg
ニブラジロール	ハイバジュールコーワ錠3/6

sGC 刺激薬の商品名

成分名	商品名
リオシグアト	アデムパス錠0.5mg/1.0mg/2.5mg

保険薬事典 令和4年8月版より改変